



SUPRALYT®

Tilskudsfoeder
Complementary
feed

15 kg

**Diætetisk foder til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen /
Dietetic feed for stabilization of water and electrolyte balance**

Sammensætning/Composition

Glucose, natriumbicarbonat, maltodextrin, natriumchlorid, kaliumklorid/
Glucose, sodium bicarbonate, maltodextrine, sodium chloride,
potassium chloride.

Tørstof/Dry matter	%	98
Råprotein/crude protein	%	0,1
Råaske/Ash	%	20,4
Calcium/Ca	g/kg	0,6
Natrium/Sodium	g/kg	70
Natriumbicarbonat/Sodium Bicarbonate	g/kg	150
Klorid/Cl	g/kg	60
Fodersalt/NaCl	g/kg	70
Kalium/K	g/kg	17
Druesukker/Sugar	g/kg	630
Maltodextrin/Maltodextrine	g/kg	150

Tilsætningsstoffer/Feed additives

Vitamin A 3a672a	IU/kg	100.000
Vitamin D3 3a671	IU/kg	10.000
Vitamin E 3a700 all-rac-alpha-tocopheryl acetate	mg/kg	350
Vitamin B1, thiamine mononitrate, 3a821	mg/kg	60
Vitamin B2, riboflavin	mg/kg	82
Vitamin B6, 3a831 pyridoxine hydrochl.	mg/kg	62
Vitamin B12, cyanocobalamin	mg/kg	0,2
D-Biotin, 3a880	mg/kg	4
Folinsyre 3a316/folic acid 3a316	mg/kg	30
Niacin, 3a315 niacinamide	mg/kg	600
Pantothenic acid, calcium D-pantothen., 3a841	mg/kg	300
Choline, 3a890 choline chloride	mg/kg	520
Vitamin C, 3a300 L-ascorbic acid	mg/kg	4000

Holdbarhed/Shelf life: 18 måneder/month.

Opbevaring/storage conditions: Koldt og tørt i tillukket emballage/
Dry and cold in closed package.

Brugsanvisning og dosering:

Supralyt anvendes til kalve, svin, lam, kid og føl, hvis der foreligger risiko
for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelsesforstyrrelser.

Bland 175 g Supralyt i 5 liter varmt vand (40 - 50 gr. C).

Anvendes i 1 - 7 dage efter behov.

Supralyt må maximum anvendes som eneste foder i 2 dage.

Når Supralyt tildeles forebyggende, anvendes halv dosis.

Rengør og desinficer drikkebrug dagligt.

1 dl svarer til ca 90 g.

Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden
forlængelse af brugsperioden.

Fremstillet af: aF121110001.

Dosage and use instruction:

Calves, pigs, lambs and foal, in case of risk and
during periods of diarrhea and recovery from digestive
disturbance. Mix 35 g in 1 liter of warm water (40-50°C).

Can be used 1-7 days as needed. Supralyt must only be used as sole food
for 2 days. If used preventive use half dosage.

1 dl corresponds to approx 90 g.

It is recommended to follow veterinarian instruction first.

Manufactured of: aF121110001.



Partnummer / Lot nr:

Mindst holdbar til / Best before:

Vilofarm

+45 8887 5300