

Forebyggende anvendelse:

1. dosis gives 12-24 timer før forventet kælvning.
2. dosis gives lige efter kælvning.
3. dosis gives ca. 12 timer efter kælvning.
4. dosis gives ca 24 timer efter kælvning.

Tildeling som supplement til dyrlægens behandling:

1. dosis gives ca. 2 timer efter dyrlægens behandling. Synkerefleksen SKAL være til stede.
2. dosis gives ca. 10 timer efter den første.

Køer som tidligere har lidt af mælkefeber, særligt højtydende køer og ældre køer er særligt udsatte for at få problemer med calciumforsyningen, og som et minimum bør disse grupper tildeles ekstra calcium forebyggende.

**Opbevaring**

Tørt i original lukket beholder.

**Holdbarhed**

2 år fra produktionsdato.

**Pakninger**

4,8 liter (21 doser) i plastdunk.



Calcium +ADE



A.C. Illumsvej 6 · DK-8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 75 22
www.chemvet.dk • info@chemvet.dk

Calcium ⁺ADE

Tilskudsfoder til malkekøer med indhold af calcium, magnesium, vitaminer og let tilgængelig energi

- Calcium i en hurtigt tilgængelig form, for en hurtig optagelse.
- Calcium i en langsommere optagelig form, for en forlænget forsyning.
- Indeholder magnesium og vitaminer for at fremme optagelse og udnyttelse af calcium.
- Indeholder propylenglycol som giver koen let tilgængelig energi.
- Produktet er ikke ætsende.
- Produktet er flydende ved normale temperaturer.

Baggrund for anvendelsen af foderet

Når laktationen genoptages efter kælvning stiller det store krav til koens evne til at mobilisere calcium fra reserverne. Hvis dette behov ikke kan imødekommes fra mobiliseringen falder indholdet i blodet. Dette kan forårsage en større eller mindre grad af reversibel lammelse. Symptomerne er kendt som mælkefeber. Hvis denne tilstand ikke bliver behandlet kan den føre til koens død.

Det enkleste redskab til at forebygge forekomsten er oral tildeling af let tilgængeligt calcium i oral form i nogle få dage omkring kælvning.

Calcium ⁺ADE er udviklet med henblik på dette formål. I betragtning af at energimangel ofte går hånd i hånd med calciummangel er en relativ høj mængde propylenglycol indarbejdet i produktet for at sikre koen en kilde til let og hurtig tilgængelig energi.

Brugsvejledning

Calcium ⁺ADE kan enten anvendes forebyggende eller som supplement til dyrlægens behandling med intravenøs calcium.

Tildelingen sker med en drenchpistol i munden, og der gives en dosis på 230 ml pr. tildeling.

Spidsen af drenchpistolen placeres bagest på koens tunge og produktet presses ud med en passende hastighed, så koen kan nå at synke det.

Koens hoved holdes vandret under tildelingen.