Bayvantic findes nu til hunde i fem forskellige vægtklasser

FULD TILFREDSHED GARANTI ELLER PENGENE TILBAGE

Undgå flåternes bid og blodsugning med Bayvantic

Flåter diskriminerer ikke, når det kommer til at finde værtsdyr, de kan suge blod på. De blodsugende parasitter angriber store som små hunde, og der er derfor risiko for overførte sygdomme fra inficerede parasitter. Flåtbårne sygsomme kan overføres indenfor få timer efter et parasit-angreb. Derfor er det vigtigt at forebygge og behandle med et præparat, der har en anti-blodsugende (repellerende) effekt.

Må ikke bruges til katte

Bayvantic® Vet. spot-on, opløsning til hund (1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin). **Indikationer:** Til behandling og forebyggelse af loppeangreb *(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis)* på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlings-strategien ved loppebetinget allergisk dermatit. Til behandling af pelslus *(Trichodectes canis)*. Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod flåtangreb *(Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i 4 uger og Dermacentor reticulatus i 3 uger)*. Reducerer sandsynligheden for ehrlichiosis ved at repellere og dræbe *Rhipicephalus sanguineus* fra dag 3 efter behandling og op til 4 uger. Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod. En behandling har repellerende („anti-blodsugende") virkning på sandfluer (*Phlebotomus papatasi* i 2 uger og *Phlebotomus perniciosus* i 3 uger), på myg (*Aedes aegypti* i 2 uger og *Culex pipiens* i 4 uger) og på almindelige stikfluer (*Stomoxys calcitrans*) i 4 uger. Der kan forekomme fæstnelse af enkelte flåter eller stik fra enkelte sandfluer eller myg. Derfor kan overførsel af infektiøse sygdomme via disse parasitter ikke fuldstændig udelukkes, hvis forholdene er ugunstige. **Dosering:** Kun til brug på huden. 1,5-4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4-10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10-25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25-40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; 40-60 kg: 1 pipette a 6,0 ml. Til hunde på over 60 bruges en passende kombination af pipetter. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til katte. Hvalpe under 7 uger og 1,5 kg bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. **Bivirkninger:** I meget sjældne tilfælde kan der hos hunde ses forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, alopecia (hårtab), og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed. Hundene kan vise adfærdsændring (uro, rastløshed, piben eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (opkastning, diarré, øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden er følsom overfor permethrin. Symptomerne er normalt forbigående og kræver ingen behandling. **Drægtighed og diegivning:** Kan anvendes under drægtighed og laktation. **Særlige forsigtighedsregler:** Må ikke anvendes til katte, da det er særdeles giftigt for dem og kan være livsfarligt på grund af kattes særlige fysiologi og manglende evne til at metabolisere visse stoffer inklusive permethrin. For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for præparatet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte indtil påføringsstedet er tørt. Katte må ikke slikke på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Nyligt behandlede dyr bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. Tillad under ingen omstændigheder at behandlede hunde får adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Vask hænderne grundigt efter brug. Opløsningsmidlet i Bayvantic® Vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt med disse materialer tillades. **Udlevering:** HV. **Pakninger:** Bayvantic® Vet. pakninger med 4 pipetter: 0,4 ml – 1,0 ml – 2,5 ml – 4,0 ml – 6,0 ml. For yderligere information læs indlægssedlen. **Indehaver af markedsføringstilladelse:** Bayer Animal Health GmbH, Leverkusen, Tyskland. Teksten er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumè dateret 31/08/2017 (Bayvantic 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml og 4,0 ml) og 12/12-2017 (Bayvantic 6,0 ml). Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Bayer A/S, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com, www.bayvantic.dk. December 2018.

Bayvantic® vet
IMIDACLOPRID + PERMETHRIN

DK1901P07